

第 2 類
医薬品

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保存してください。

漢方薬

とう き しゃく や く さ ん

当帰芍薬散エキス錠OM



【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 胃腸の弱い人。
 - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】 本品1日量（9錠）中

「日局」ト ウ キ……1.5g 「日局」ブ ク リ ヨ ウ ……2.0g
「日局」セ ン キ ュ ウ……1.5g 「日局」ビ ャ ク ジ ュ ツ ……2.0g
「日局」シ ャ ク ヤ ク……3.0g 「日局」タ ク シ ャ ……2.0g

上記生薬より得た当帰芍薬散エキス（1/2量）2200mgを含む。

なお、添加物としてクロスカルメロースNa、カルメロースCa、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、タルク、黄色5号、カルナウバロウを含む。

- 【効能・効果】 体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：
- 月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

- 【用法・用量】 次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。
（食間とは、食後2～3時間を指します。）

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	3 錠	3回
15歳未満5歳以上	2 錠	
5歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出る場合がありますが、効果には変わりありませんので安心して服用してください。

*【お問い合わせ先】 伸和製薬株式会社 情報管理室
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町13-4
電 話：0120-019-776
受付時間：9時から17時まで（土・日曜、祝日を除く）

*発 売 元

伸 和 製 薬 株 式 有 限 公 司
東京都中央区日本橋小伝馬町13-4



製造販売元

大 峰 堂 薬 品 工 業 株 式 有 限 公 司
奈良県大和高田市根成柿574番地